

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan rentang masa kehamilan, persentase trimester I adalah 39,9% (20 ibu hamil), trimester II adalah 32,2% (19 ibu hamil), dan trimester III adalah 39,9% (20 ibu hamil).
- 5.1.2 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan kondisi jaringan *periodontal*, persentase paling besar adalah 23,7% (14 ibu hamil) pada kategori karang gigi.
- 5.1.3 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan hubungan masa kehamilan dengan jaringan *periodontal*, sebanyak 13,6% (8 ibu hamil) pada trimester I dengan kategori sehat sementara 10,2% (6 ibu hamil) pada trimester III dengan kategori poket dalam
- 5.1.4 nilai *p-value* 0,000 menunjukkan bahwa ada hubungan masa kehamilan dengan jaringan *periodontal* pada ibu hamil di Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi. Hasil analisis dikatakan berhubungan secara bermakna karena nilai α berada kurang dari rentan 0,05.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

1. Wawasan dan referensi ilmiah mengenai hubungan trimester kehamilan dengan keadaan jaringan *periodontal* pada ibu hamil dapat dipahami untuk deteksi dini kesehatan ibu hamil.
2. Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesehatan gigi dan mulut, khususnya dalam bidang kesehatan ibu hamil dapat mencegah masalah kondisi jaringan *periodontal*.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi Ibu Hamil

Ibu hamil lebih menambah wawasan dan pengalaman, khususnya dalam bidang kesehatan gigi dan mulut

2. Bagi Puskesmas

Pelayanan kesehatan primer lebih intensif meningkatkan program skrining dan edukasi kesehatan gigi bagi ibu hamil.

3. Bagi Jurusan Kesehatan Gigi

Hasil penelitian menjadi referensi yang memperkaya koleksi penelitian institusi sebagai bukti kontribusi keilmuan kesehatan gigi.